

登園できない病気の一覧

鉄輪保育園

	病名	潜伏期間	感染経路	主要症状	伝染期間	登園停止期間
1	麻疹(はしか)	10～12日	飛沫感染	発熱、食欲不振、結膜炎やのどのカタル症状、口腔内にケシ粒大の白斑ができ、2～3日後に全身発疹。	発疹する数日前から発疹後3～4日間	主要症状が消えてから3日を経過するまで。解熱後3日程度。
2	風疹(3日はしか)	14～21日	飛沫感染	38度前後の熱と共に、全身に発疹が出る。耳のリンパが腫れる。	発疹が消えるまで。	主要症状が消えるまで。
3	溶連菌感染症	2～7日	飛沫感染	発熱、咽頭痛、細かい鮮やかな発疹が出る。		抗生物質投与後、2日経過するまで。
4	水痘(水ぼうそう)	14～21日	飛沫感染	発熱、頭、手足、胸に赤い粟粒状の湿疹。頭髮の中にも発疹、水疱となる。	かさぶたとなるまで。	発疹すべてがかさぶたになるまで。
5	流行性耳下炎(おたふくかぜ)	14～21日	飛沫感染	発熱、耳たぶが腫れる。	耳下腺の腫れが日九まで。	耳下腺の腫れが消失するまで。
6	インフルエンザ	1～4日(平均2日)	飛沫感染 接触感染	発熱、くしゃみ、鼻づまり、咽頭の腫れ、関節痛。	発病、1～2日前から発病、3～4日後	発症した後5日を経過し、かつ解熱後3日。 (※平成24年11月厚労省参考)
7	伝染性膿瘡疹(とびひ)		接触感染	全身いたるところに、エンドウ大の水疱は発生し、破れてただれ、かさぶたをつくる。	化膿した部分が治るまで。	医師の指示に従う。
8	咽頭結膜炎(プール熱)	7日	飛沫感染 ウイルス	夏風邪の一種。 発熱と咽頭炎。結膜炎は伝染するので、要注意。		医師の指示に従う。
9	流行性結膜炎		接触感染 ウイルス	白目、まぶたの裏側の結膜が腫れる。 眼脂が多く出る。	眼脂が出る間。	主要症状が消えるまで。 数日間。
10	手足口病	5～10日		口内粘膜疹、手、掌、足底に米粒大の水疱、微熱が出る人もいる。	1～2週間	治癒するまで。 いつもの食事が食べられる。
11	突発性発疹	7～17日	飛沫感染 ウイルス	風邪の症状で、熱のあとに発疹が現れる。		症状による。 医師の指示に従う。
12	伝染性紅斑(りんご病)	6～14日	飛沫感染	鼻を中心に左右対称の鮮やかな紅斑ができ、やや熱感気味。 肩、手足に発疹が出ることもある。	紅斑が出現するまで	症状による。 医師の指示に従う。
13	嘔吐・下痢症(はきくだし)	1～2日	接触感染 ウイルス	ウイルス性のお腹の風邪。ロタウイルスが有名ですが、他のウイルスが原因になることもある。 汚れた手や唾液などを介して感染するので、うがい・手洗いを必ずする。	下痢・嘔吐が治まるまで	症状による。 医師の指示に従う。